



# រូបមន្តព្យាបាលជំងឺរបេងកុមារអាយុក្រោម ១៥ឆ្នាំ



មជ្ឈមណ្ឌលជាតិកំចាត់រោគរបេង និង ហេតុសាសនា

## រូបមន្តប្រភេទទី១: 2RHZE/4RH

ប្រើ ឱសថរបេងកុមារ សំរាប់កុមារទំងន់តិចជាង ឬស្មើ 20 kg (≤ 20 kg)					
ទម្ងន់មុនពេលព្យាបាល (គ.ក្រ)	ដំណាក់កាលដំបូង: រយៈពេល ២ ខែ			ដំណាក់កាលបន្ត: រយៈពេល ៤ ខែ	
	RHZ 60/30/150	RH 60/60	E 100	RH 60/30	RH 60/60
5 - 7	1 គ្រាប់	1 គ្រាប់	1 គ្រាប់	1 គ្រាប់	1 គ្រាប់
8 - 14	2 គ្រាប់	1 គ្រាប់	2 គ្រាប់	2 គ្រាប់	1 គ្រាប់
15 - 20	3 គ្រាប់	2 គ្រាប់	3 គ្រាប់	3 គ្រាប់	2 គ្រាប់

  

ប្រើ ឱសថរបេងមនុស្សចាស់ និង RH (60/60) សំរាប់កុមារទំងន់ពី 21-30 kg					
ទម្ងន់មុនពេលព្យាបាល (គ.ក្រ)	ដំណាក់កាលដំបូង: រយៈពេល ២ ខែ			ដំណាក់កាលបន្ត: រយៈពេល ៤ ខែ	
	RHZE 150/75/400/275	RH 60/60	RH 150/75	RH 60/60	RH 60/60
21 - 30	2 គ្រាប់	2 គ្រាប់	2 គ្រាប់	2 គ្រាប់	2 គ្រាប់

កំរិតជាតិថ្នាំ/គ.ក្រ/1ថ្ងៃ R=15mg (10-20), H=10mg (10-15), Z=35mg (30-40), E=20mg (15-25)

រូបមន្តប្រភេទទី ១ នេះ គឺសំរាប់ព្យាបាលកុមារដែលមានជំងឺរបេងករណីថ្មីនៃ :

- ជំងឺរបេងសួតវិជ្ជមានបេកា - ជំងឺរបេងសួតអវិជ្ជមានបេកា សណ្ឋានធ្ងន់ធ្ងរ (មានដំបៅសួតរាលដាល)
- ជំងឺរបេងក្រៅសួត សណ្ឋានធ្ងន់ធ្ងរ - ជំងឺរបេង/អេដស៍

## រូបមន្តប្រភេទទី១: 2RHZE/10RH

ប្រើ ឱសថរបេងកុមារ សំរាប់កុមារទំងន់តិចជាង ឬស្មើ 20 kg (≤ 20 kg)					
ទម្ងន់មុនពេលព្យាបាល (គ.ក្រ)	ដំណាក់កាលដំបូង: រយៈពេល ២ ខែ			ដំណាក់កាលបន្ត: រយៈពេល ១០ ខែ	
	RHZ 60/30/150	RH 60/60	E 100	RH 60/30	RH 60/60
5 - 7	1 គ្រាប់	1 គ្រាប់	1 គ្រាប់	1 គ្រាប់	1 គ្រាប់
8 - 14	2 គ្រាប់	1 គ្រាប់	2 គ្រាប់	2 គ្រាប់	1 គ្រាប់
15 - 20	3 គ្រាប់	2 គ្រាប់	3 គ្រាប់	3 គ្រាប់	2 គ្រាប់

  

ប្រើ ឱសថរបេងមនុស្សចាស់ និង RH (60/60) សំរាប់កុមារទំងន់ពី 21-30 kg					
ទម្ងន់មុនពេលព្យាបាល (គ.ក្រ)	ដំណាក់កាលដំបូង: រយៈពេល ២ ខែ			ដំណាក់កាលបន្ត: រយៈពេល ១០ ខែ	
	RHZE 150/75/400/275	RH 60/60	RH 150/75	RH 60/60	RH 60/60
21-30	2 គ្រាប់	2 គ្រាប់	2 គ្រាប់	2 គ្រាប់	2 គ្រាប់

កំរិតជាតិថ្នាំ/គ.ក្រ/1ថ្ងៃ R=15mg (10-20), H=10mg (10-15), Z=35mg (30-40), E=20mg (15-25)

នៅក្នុងរូបមន្តព្យាបាលរបេងកុមារនេះសំរាប់ព្យាបាល:

- របេងស្រោមខ្នុរ - របេង មីលីយែរ
- របេងឆ្អឹង/ របេងសន្លាក់ឆ្អឹង (Osteoarticular TB)

## រូបមន្តប្រភេទទី២: 2SRHZE/1RHZE/5RHE

ប្រើ ឱសថរបេងកុមារ សំរាប់កុមារទំងន់តិចជាង ឬស្មើ 20 kg (≤ 20 kg)										
ទម្ងន់មុនពេលព្យាបាល (គ.ក្រ)	ដំណាក់កាលដំបូង: រយៈពេល ៣ ខែ									ដំណាក់កាលបន្ត: រយៈពេល ៥ ខែ
	សំរាប់ខែទី១ និងខែទី២				សំរាប់ខែទី៣					
	RHZ 60/30/150	RH 60/60	E 100	S 1 g	RHZ 60/30/150	RH 60/60	E 100	RH 60/30	RH 60/60	
5 - 7	1 គ្រាប់	1 គ្រាប់	1 គ្រាប់	100 mg	1 គ្រាប់	1 គ្រាប់	1 គ្រាប់	1 គ្រាប់	1 គ្រាប់	1 គ្រាប់
8 - 14	2 គ្រាប់	1 គ្រាប់	2 គ្រាប់	200 mg	2 គ្រាប់	1 គ្រាប់	2 គ្រាប់	2 គ្រាប់	1 គ្រាប់	2 គ្រាប់
15 - 20	3 គ្រាប់	2 គ្រាប់	3 គ្រាប់	300 mg	3 គ្រាប់	2 គ្រាប់	3 គ្រាប់	3 គ្រាប់	2 គ្រាប់	3 គ្រាប់

  

ប្រើ ឱសថរបេងមនុស្សចាស់ និង RH (60/60) សំរាប់កុមារទំងន់ពី 21-30 kg										
ទម្ងន់មុនពេលព្យាបាល (គ.ក្រ)	ដំណាក់កាលដំបូង: រយៈពេល ៣ ខែ									ដំណាក់កាលបន្ត: រយៈពេល ៥ ខែ
	សំរាប់ខែទី១ និងខែទី២				សំរាប់ខែទី៣					
	RHZE 150/75/400/275	RH 60/60	S 1 g	RHZE 150/75/400/275	RH 60/60	RH 150/75	RH 60/60	E 400		
21-30	2 គ្រាប់	2 គ្រាប់	400 mg	2 គ្រាប់	2 គ្រាប់	2 គ្រាប់	2 គ្រាប់	2 គ្រាប់	1 គ្រាប់	

កំរិតជាតិថ្នាំ/គ.ក្រ/1ថ្ងៃ R=15mg (10-20), H=10mg (10-15), Z=35mg (30-40), E=20mg (15-25), S= 15 mg

រូបមន្តប្រភេទទី ២ នេះ មានរយៈពេលសរុប ៨ ខែ និងសំរាប់ព្យាបាលជំងឺរបេងដូចខាងក្រោម:

- ករណីរបេងលាប - ករណីរបេងបរាជ័យ
- ករណីរបេងត្រឡប់មកវិញក្រោយបោះបង់ - ករណីផ្សេងៗ

## រូបមន្តប្រភេទទី៣: 2RHZ/4RH

ប្រើ ឱសថរបេងកុមារ សំរាប់កុមារទំងន់តិចជាង ឬស្មើ 20 kg (≤ 20 kg)				
ទម្ងន់មុនពេលព្យាបាល (គ.ក្រ)	ដំណាក់កាលដំបូង: រយៈពេល ២ ខែ		ដំណាក់កាលបន្ត: រយៈពេល ៤ ខែ	
	RHZ 60/30/150	RH 60/60	RH 60/30	RH 60/60
5 - 7	1 គ្រាប់	1 គ្រាប់	1 គ្រាប់	1 គ្រាប់
8 - 14	2 គ្រាប់	1 គ្រាប់	2 គ្រាប់	1 គ្រាប់
15 - 20	3 គ្រាប់	2 គ្រាប់	3 គ្រាប់	2 គ្រាប់

  

ប្រើ ឱសថរបេងមនុស្សចាស់ និង RH (60/60) សំរាប់កុមារទំងន់ពី 21-30 kg				
ទម្ងន់មុនពេលព្យាបាល (គ.ក្រ)	ដំណាក់កាលដំបូង: រយៈពេល ២ ខែ		ដំណាក់កាលបន្ត: រយៈពេល ៤ ខែ	
	RHZE 150/75/400/275	RH 60/60	RH 150/75	RH 60/60
21- 30	2 គ្រាប់	2 គ្រាប់	2 គ្រាប់	2 គ្រាប់

កំរិតជាតិថ្នាំ/គ.ក្រ/1ថ្ងៃ R=15mg (10-20), H=10mg (10-15), Z=35mg (30-40), E=20mg (15-25)

រូបមន្តប្រភេទទី ៣ នេះគឺសំរាប់ព្យាបាលកុមារដែលមានជំងឺរបេងករណីថ្មី :

- របេងសួតអវិជ្ជមានបេកា សណ្ឋានមិនធ្ងន់ធ្ងរ (មិនមានដំបៅសួតរាលដាល)
- របេងក្រៅសួត សណ្ឋានមិនធ្ងន់ធ្ងរ (កូនកណ្តុរ, ស្រោមសួតម្ខាង)

សំនុំថ្នាំ : RHZE : រីហ្វាមីស៊ីន + អ៊ីសូនីយ៉ាស៊ីដ + ពិរ៉ាស៊ីណាមីដ + អេតាំប៊ុយតុល, RHZ : រីហ្វាមីស៊ីន + អ៊ីសូនីយ៉ាស៊ីដ + ពិរ៉ាស៊ីណាមីដ  
 RH : រីហ្វាមីស៊ីន + អ៊ីសូនីយ៉ាស៊ីដ, E : អេតាំប៊ុយតុល, S : ស្ត្រីបតូមីស៊ីន, H : អ៊ីសូនីយ៉ាស៊ីដ